

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[3]期

绍兴市气象台

二〇一八年一月三十一日

二月上旬以晴到多云天气为主，
气温较常年显著偏低

一、前期天气回顾

一月下旬冷空气活动频繁，我市以阴雨（雪）天气为主，其中24至28日出现持续的雨夹雪或雪天气，全市普遍出现1~3厘米、部分山区5~10厘米的积雪，最大为柯桥丹家13厘米、诸暨钟家岭10厘米；另外，30日后半夜至31日又出现小雪天气；气温前高后低，变化幅度较大，其中25日起日平均气温降至1℃以下，旬平均气温较常年偏低，极端最高气温出现在诸暨（22日11.7℃），极端最低气温出现在嵊州（30日-5.4℃）。

表 1：1 月 21 日至 31 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	2.3	4.2	74.6	28.8	12.9	37.0	9	4.5

注：常年指 1981~2010 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计二月上旬冷空气活动频繁，我市以晴到多云天气为主，旬雨量较常年明显偏少，气温前低后高，变化幅度较大，旬平均气温较常年显著偏低。

2月1至6日受冷高压控制，以晴冷天气为主，早晨最低气温-3~-5℃，山区-5~-7℃，将出现冰冻或严重冰冻；7至10日仍以晴到多

云天气为主，气温快速回升。

具体要素预报如下：

旬雨量	0~5 毫米	旬平均气温	1~2℃
旬雨日	0~1 天	极端最低气温	-5~-7℃

三、农事建议

1、春粮、油菜。当前，大小麦、蚕豌豆、油菜生长正处于苗期，要做好清沟理渠工作，及时排除田间积水，适当喷施防冻剂，以提高地温和植株体田间小气候温度，防止低温天气田间结冰对作物造成冻害。

2、蔬菜。当前，瓜类育苗、茄果类蔬菜也正值定植期、越冬番茄茄子正值采收期，要加固大棚，及时清除棚膜上的积雪，防止大雪压塌大棚；做好保暖防冻工作，重点是瓜菜育苗棚，多层覆盖保温，必要时开启电热线与补光灯增温补光，点蜡烛、燃烟防冻害；抢收部分蔬菜，室内存放，提高效益；清沟排水，防止雪水（冰水）倒灌，引起植株低温冷害萎根。

3、水果。尽快摇落枇杷、杨梅等常绿果树上积雪，避免枝干断裂；当前正值枇杷幼花幼果期，雪后晴天要及时将花、果穗上的雪去除，使花果表面快速干燥，防止果穗因湿润结冰加重冻害；大棚设施要及时扒雪，必要时可采取破膜保棚架等应急措施；及时清除枯枝，适度修剪，防治病虫。

4、茶叶。对于低洼积水的茶园、苗圃，要及时开沟排水；及时清除苗圃棚架表面积雪，防止塌架受损；做好茶厂、休闲观光茶园等相关设施的雪冻防护工作。

5、水产养殖。做好加固保温大棚和温室，增加支撑；及时将顶棚积雪清除，抢修坍塌或损坏的大棚；补盖破损保温薄膜，尽快使池

塘水温提升；可以采取大功率灯泡加热或其它加热措施，适当提升棚内温度。

6、畜禽养殖。要对畜禽舍及设施作全面检修，危险畜禽舍注意加固，雪后要及时清除积雪，防止畜禽舍倒塌；对开放式的猪舍，要盖上塑料薄膜，以提高舍内温度；加强动物防疫工作，及时做好畜禽舍的消毒隔离，

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处