

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[29]期

绍兴市气象台

二〇一九年十月二十一日

## 十月下旬晴多雨少，平均气温较常年偏高

### 一、前期天气回顾

十月中旬我市晴多雨少，全市面雨量仅5.7毫米，较常年明显偏少，降水主要出现在14日，以小雨为主；受14~15日的冷空气影响气温下降。旬内气温前高后低，变化幅度较大，我市正式入秋。旬平均气温19.1~20.2℃，西部较常年同期偏高1.5℃左右，东部地区略偏高0.5℃左右，极端最低气温11.1℃（20日嵊州站），极端最高气温30.5℃（11日诸暨站）。

表 1: 10月11日至20日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	20.2	18.8	3.6	18.4	46.8	49.9	1	3.2

注：常年指1981~2010年30年平均值。

### 二、后期天气预测

预计十月下旬晴多雨少持续，除23日夜间、26日部分地区有小雨、30日有小到中雨外，其他以多云或晴天气为主。旬雨量、雨日比常年偏少，气温小幅起伏，旬平均气温比常年偏高。

旬初21至22日高压底部，晴到多云；23后期至24日前期受小槽东移影响，部分地区有小雨；26日前后受弱冷空气影响，部分地区有小雨，气温小幅下降；27至28日均压区，云系较多；30日前后受弱冷空气和地面倒槽影响，有小到中雨，气温有所下降。

具体要素预报如下：

旬雨量	5~15 毫米	旬平均气温	17~19℃
旬雨日	1~2 天	极端最低气温	11~12℃

### 三、农事建议

1、从目前资料来看，10月下旬晴多雨少，有利稻谷收割晾晒，但须随时关注天气变化，防范稻谷晾晒过程受到小雨影响，必要时用烘干机对稻谷进行烘干，保证颗粒归仓。

2、做好油菜秧苗的管理。过去一周连续无降水，本旬29日以前又无有效降水，土壤墒情逐步转差，因此油菜大田要及时浇水以利生长。

3、北部地区加强棉田后期管理。及时摘除老叶，改善棉田通风透光条件，促进棉桃的裂铃，同时及时采摘已吐絮棉花，精收细摘，确保棉花质量。

---

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户

报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处