

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[23]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年8月11日

八月中旬多午后雷阵雨，气温较常年略偏高

一、前期天气回顾

八月上旬我市晴热高温持续，每天午后有分散性雷阵雨。全市旬平均气温 31.6°C ，较常年异常偏高 2.1°C ，旬极端最高气温 38.1°C （8月9日诸暨站），旬极端最低气温 24.9°C （8月1日上虞站），旬日照时数83.7小时，较常年略偏多1成多。全市平均旬雨量8.1毫米，较常年异常偏少近9成。各区（县、市）雨量分别为柯桥37.7毫米、诸暨2.1毫米、上虞0.6毫米、新昌和嵊州几无降水。

旬内晴热高温天气为主，仅3至5日部分地区有较明显雷阵雨。高温少雨天气对各类作物的生长有一定程度的不利影响。

表 1：8 月 1 日至 10 日柯桥站气象要素表

要素	气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	32.4	30	37.7	62.5	75	78.3	3	4.4

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

八月中旬我市晴热高温持续，多午后分散性阵雨或雷雨。具体来看，预计今天晴到多云，午后到夜里部分有阵雨或雷雨，明天多云，有时阴有阵雨或雷雨，以上有雷雨时可伴有短时暴雨和局地8~10级雷暴大风；13日至17日副高加强西伸北抬，晴到多云天气为主，午后局部阵雨或雷雨，最高气温可达36~37℃，局部38℃以上；18至20日晴到多云为主，午后有分散性雷阵雨。

具体要素预报如下：

旬雨量	20~30 毫米	旬平均气温	28~30℃
旬雨日	1~3 天	极端最高气温	36~38℃

三、农事建议

1、做好水稻田间管理。目前单季稻普遍处于幼穗分化期，连作晚稻处于分蘖期。对处于分蘖期的连作晚稻要保持浅水层，有利于分蘖的发生；由于中旬仍多晴热高温天气，对幼穗分化期有一定影响，宜采取田间灌5-8cm深水，可有效降低穗层温度，保护水稻免受高温伤害，有条件的地方可采用活水套灌或日灌夜排，在降温的同时可有效增加田间空气湿度，改善稻田小气候，促进根系健壮生长，必要时还可通过喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯以及硅、锌等中微量元素的叶面肥，提高植株抗逆性，增强水稻抗高温能力。

2、加强果园、菜园管理，及时采收已成熟瓜果蔬菜。中旬我市持续晴热高温天气，对于已经出现干旱，无法保证水源的蔬菜，要及时采收；对于水源较充足地区及时抢播一批抗热的速生叶菜，以保障近期蔬菜供应；对已经成熟的葡萄、猕猴桃等水果，要及时采摘，预防出现日灼病。同时特别要

关注强对流天气，要在大风与大雨来临前抢收，预防出现落果，造成经济损失。

3、加强稻田病虫害的监测和防治。上旬多晴热高温天气，病虫害活动较少，中旬相比上旬发生强对流天气的条件较好，高温高湿易诱发病虫害的发生和蔓延。各地要加强水稻田病虫害，特别是二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱和纹枯病等的监测，采用对口农药，科学防治。

4、水产养殖户要多巡塘，加强水质管理，并勤开增氧机。遇到连续高温或者天气突变，要开启增氧机且适当延长开启时间，防范高温雷雨天气池塘缺氧发生鱼噤，畜禽饲养户也要做好棚舍的防暑降温工作。

5、做好强对流天气的防范工作。中旬多午后分散性雷阵雨，并可能伴有局地强对流，农民朋友要高度重视，防范局地短时暴雨和8~10级雷雨大风等强对流天气的不利影响，雷电发生时应停止田间劳作，做好防雷电措施。此外，在强对流天气来临前，蔬菜、花卉大棚等设施农业要提前检查加固，如遇短时强降水造成棚内积水，要及时排出。

6、做好防暑降温工作。八月中旬晴热高温天气持续，请有关部门和单位落实防暑降温措施，农户应尽量避免在高温时段劳作，劳作时间选择在上午9时前或下午5时后，外出前做好防晒准备，尽量穿浅色透气性好的服装，在大量出汗后要注意及时补充水分，谨防中暑。